

PROCEDURA SANITARNA DLA FERM DROBIU



PUSTE POMIESZCZENIA

1	Zastosować środki owado- i larwobójcze zaraz po wyprowadzeniu ptaków, dopóki pomieszczenia są jeszcze nagrzane
2	CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMU POJENIA Zastosować 2% roztwór LERASEPT FD 406 (nadtlenek wodoru) lub 1% roztwór LERASEPT SPEZIAL (nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy). Pozostawić w sieci na min. 6 h. Po tym czasie opróżnić system i dokładnie przepłukać wodą tak długo jak popłuczyny będą brudne. W celu usunięcia glonów czy biofilmu należy użyć 2% roztworu LERADES C-MA. Pozostawić w układzie na min. 6 h. Jeśli system jest mocno zakamieniony należy zastosować uprzednio 1% roztwór LERACID S-MA (kwas azotowy). Płukać wodą po każdym preparacie.
3	Usunąć ściółkę i pomiot, zmyć wodą pod ciśnieniem
4	MYCIE ŚCIAN, POSADZEK I WYPOSAŻENIA Nanieść za pomocą lancy pianowej lub wytwornicy piany 2% roztwór LERADES SZ 120 (chlorowy) lub LERAPUR SR 115 (na bazie sody). Do nanoszenia przez myjkę ciśnieniową stosować 2% roztwór LERAPUR N 304 (neutralny). Na każde 3 m² należy użyć ok. 1 l roztworu. Splukać pod ciśnieniem po 20 min.
5	DEZYNFEKCJA NA MOKRO ŚCIAN I POSADZKI PRZED ZAŚCIELENIEM Po osuszeniu hali - przez rozpylanie tzw. „grubą kroplą” 1,5% roztworem LERASEPT FORTE lub LERASEPT AKTIV (na bazie kwasu nadoctowego) lub preparatem na bazie aldehydów: LERASEPT T 430 w stężeniu 1%. Zużycie 1 l roztworu na 3-4 m² powierzchni.
6	ZAMGLAWIANIE TERMICZNE Po wprowadzeniu ściółki zamknąć obiekt i zamglawiać preparatem LERASEPT T 430. Używamy 1 litr preparatu + 1 l wody + 100 ml nośnika do zamglawiania na każde 1000 m³. Jeśli do dezynfekcji kurnika na mokro użyto środka LERASEPT T 430 to do zamglawiania w celu zmiany czynnika bójczego używamy LERASEPT AKTIV lub LERASEPT FORTE.



UWAGA!

Badania udowodniły, że przestrzeganie takiej procedury mycia i dezynfekcji prowadzi do prawie 100% czystości mikrobiologicznej środowiska.

W OBECNOŚCI ZWIERZĄT

1	Dezynfekować przez rozpylenie (tylko gruba kropla – nie zamglawiać!) 2% roztworem LERASEPT D 402 lub LERASEPT L 420
2	Brodziki i maty dezynfekcyjne: używać 2% roztworu LERASEPT T 430 lub LERASEPT D 402 uzupełniając regularnie 2-3 razy w tygodniu

SANITYZACJA WODY PITNEJ

1	Stosować okresowo LERASEPT FD 406 w proporcjach 300-400 ml na 1000 litrów wody lub LERASEPT SPEZIAL w proporcjach 100-200 ml na 1000 litrów wody
2	Do ciągłego przepajania zalecamy LERASEPT FD 406 w ilości 150 ml na 1000 litrów wody



**NOWA TECHNOLOGIA
W DEZYNFEKCJI****Lerasept T 430
Lerasept Aktiv**

Środki biobójcze stosuj bezpiecznie.

Przed użyciem zawsze sprawdź oznaczenie i przeczytaj informację o produkcie.

LERASEPT T 430 – produkt wpisany na listę DV**WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE**

Lerasept T 430 jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekującym o silnym działaniu:

- bakteriobójczym na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych;
- wirusobójczym (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane);
- grzybobójczym

Lerasept T 430 znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów, pojazdów i powierzchni:

- w budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody i bydła
- wylęgarniach drobiu
- polecany również do mat dezynfekcyjnych

BUDOWA CHEMICZNA

- aldehyd glutarowy
- glioksal
- formaldehyd
- czwartorzędowe sole amonowe
- alkohol izopropylowy

SPOSÓB UŻYCIA

Lerasept T 430 może być stosowany w formie:

- oprysku lub piany w stężeniu 1-2% (0,3-0,5 litra roztworu na 1 m²)
- zamgławiania termicznego (1 litr preparatu + 1 litr wody + 100 ml nośnika na 1000 m³)
- zamgławiania ULV (1 litr preparatu + 4 litry wody + 100 ml nośnika na 1000 m³)
- na maty dezynfekcyjne i niecki wjazdowe – stężenie 1%

LERASEPT AKTIV – Nowość na rynku**WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE**

Lerasept Aktiv jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekującym o silnym działaniu: bakteriobójczym i wirusobójczym i grzybobójczym. Działa szybko i skutecznie nawet w niskich temperaturach i na zimnych, nie nagrzanych powierzchniach.

Lerasept Aktiv znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów i powierzchni w budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody i bydła. Dzięki specjalnym inhibitorom korozji jest bezpieczny dla powierzchni metalowych. Polecamy do mycia i odkażania klatek dla niosek – produkt jest bezpieczny dla powierzchni ocynkowanych w zalecanych proporcjach.

BUDOWA CHEMICZNA

- kwas nadociowy
- nadtlenek wodoru
- kwas octowy
- anionowe związki powierzchniowo-czynne
- inhibitory korozji

SPOSÓB UŻYCIA

Lerasept Aktiv może być stosowany w formie:

- oprysku lub piany w stężeniu 1-2% (0,3-0,5 litra roztworu na 1 m²)
- zamgławiania termicznego (1 litr preparatu + 1 litr wody + 100 ml nośnika na 1000 m³)
- zamgławiania ULV (1 litr preparatu + 4 litry wody + 100 ml nośnika na 1000 m³)
- do mycia i dezynfekcji klatek dla niosek w stężeniu 2% (najlepiej przy użyciu myjki wysokociśnieniowej)

Lerasept Aktiv znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów i powierzchni w budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody i bydła. Dzięki specjalnym inhibitorom korozji jest bezpieczny dla powierzchni metalowych. Polecamy do mycia i odkażania klatek dla niosek – produkt jest bezpieczny dla powierzchni ocynkowanych w zalecanych proporcjach. Jedyny tego typu preparat na rynku!!!

STOSOWANIE LERASEPTU T 430 I LERASEPTU AKTIV PODCZAS TEGO SAMEGO CYKLU SANITARNEGO (NP. LERASEPT AKTIV - GRUBA KROPLA I LERASEPT T 430 - ZAMGŁAWIANIE) ZNACZNIE ZMNIEJSZA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA OPORNOŚCI I ZDECYDOWANIE ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI